CUÁNDO IR A LA SALA DE EMERGENCIAS VS. AL PEDIATRA

PEDIATRA



IRRITABILIDAD O CÓLICOS



DOLOR DE OÍDO



DIARREA O VÓMITOS



DOLOR DE GARGANTA, FIEBRE O SÍNTOMAS DE RESFRIADO

SALA DE EMERGENCIA



HUESOS ROTOS



LESIONES GRAVES O QUEMADURAS



PENSAMIENTOS SUICIDAS



DIFICULTAD PARA RESPIRAR

TYLENOL LÍQUIDO PARA NIÑOS (ACETAMINOFÉN) 160 MG/5 ML

CANTIDAD DE MEDICAMENTO QUE SE DEBE ADMINISTRAR POR DOSIS

WEIGHT (LBS)	WEIGHT (KG)	
5.5 - 6.38 LBS	2.5 - 2.9 KG	1.25 ML
6.4 - 7.7 LBS	3.0 - 3.5 KG	1.5 ML
7.8 - 9.2 LBS	3.6 - 4.2 KG	1.75 ML
9.3 - 10.6 LBS	4.3 - 4.8 KG	2 ML
10.7 - 11.7 LBS	4.9 - 5.3 KG	2.25 ML
11.8 - 12.8 LBS	5.4 - 5.8 KG	2.5 ML
12.9 - 13.9 LBS	5.9 - 6.3 KG	2.75 ML
14.0 - 16.3 LBS	6.4 - 7.4 KG	3 ML
16.4 - 18.7 LBS	7.5 - 8.5 KG	3.5 ML
18.8 - 20.9 LBS	8.6 - 9.5 KG	4 ML
21.0 - 23.3 LBS	9.6 - 10.6 KG	4.5 ML
23.4 - 27.9 LBS	10.7 - 12.7 KG	5 ML

MOTRIN LÍQUIDO PARA NIÑOS (IBUPROFENO) 100 MG/5 ML

CANTIDAD DE MEDICAMENTO QUE SE DEBE ADMINISTRAR POR DOSIS

WEIGHT (LBS)	WEIGHT (KG)	
13.2 - 15.3 LBS	6 - 6.9 KG	3 ML
15.4 - 17.5 LBS	7.0 - 7.9 KG	3.5 ML
17.6 - 19.7 LBS	8.0 - 8.9 KG	4 ML
19.8 - 21.9 LBS	9.0 - 9.9 KG	4.5 ML
22.0 - 23.9 LBS	10.0 - 10.9 KG	5 ML

*** El ibuprofeno infantil (Motrin) no debe administrarse a bebés menores de 6 meses, a menos que lo indique un médico.

¿CÓMO PUEDO SABER SI MI HIJO TIENE FIEBRE?
Se considera fiebre una temperatura de 100.4 °F o más en bebés y niños de todas las edades.

¿POR QUÉ TIENE FIEBRE MI HIJO?
La fiebre es una defensa natural contra las infecciones. En casos poco frecuentes, la dentición puede provocar un ligero aumento de la temperatura. Sin embargo, si la temperatura supera los 100.4 °F, se aconseja a los padres considerar otras posibles causas de la fiebre, además de la dentición.

¿CUÁNDO DEBO TRATAR LA FIEBRE?
Bebés de 2 meses de edad o menos: Si su bebé tiene una temperatura de 100.4 °F (38 °C) o más, llame inmediatamente a su pediatra. No le dé medicamentos para reducir la fiebre a menos que se lo indique un profesional de la salud. Es posible que su bebé necesite ser evaluado en la sala de emergencias.

Niños de 2 meses de edad en adelante: Se puede administrar acetaminofén (Tylenol) para tratar una fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más, siguiendo las indicaciones de su pediatra. No administre ibuprofeno (Motrin) a niños menores de 6 meses.

Niños de 6 meses en adelante: Se puede utilizar acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Motrin) para tratar la fiebre, siguiendo las recomendaciones de dosificación adecuadas según la edad y el peso del niño.

Si la fiebre de su hijo no mejora o le preocupan sus síntomas, comuníquese con su pediatra.

CRAWFORD COUNTY MEMORIAL HOSPITAL